



VARIETES RECOMMANDEES POUR PRAIRIES DE FAUCHE ET PATUREES EN 2025

Le choix des variétés les plus adéquates constitue une étape importante lors du semis des prairies permanentes et temporaires. Au sein du Centre Pilote Fourrages Mieux, les partenaires repris sur la liste confrontent chaque année les résultats des essais comparatifs établis dans différentes régions naturelles afin de définir les variétés les mieux adaptées aux différents types d'exploitation. Les recommandations sont formulées sur base de nombreuses années d'expérimentation dans les conditions pratiques d'utilisation, que ce soit en pâturage ou en fauche, et ce dans différents sites représentatifs de la Wallonie.

Critères d'appréciation des variétés

Les critères d'appréciation retenus pour l'élaboration des listes de variétés recommandées sont :

- la productivité énergétique (kVEM/ha) ;
- les valeurs alimentaires (MAT, digestibilité...) ;
- la résilience au niveau productivité après sécheresse ;
- la pérennité et résistance à l'hiver ;
- la vigueur et la résistance aux maladies (helminthosporiose, rouille, fusariose, ...) ;
- pour le ray-grass anglais intermédiaires et tardifs, le comportement au pâturage : appétabilité et résistance au piétinement.

Les listes présentées ne sont pas exhaustives car toutes les variétés disponibles dans le commerce n'ont pas été testées dans nos essais. Sont reprises dans les tableaux 1 et 2 les variétés qui se sont révélées les meilleures dans les essais et qui sont commercialisées en 2025.

Les partenaires expérimentateurs


Nos partenaires expérimentateurs sont répartis dans différentes régions agricoles de Wallonie :

- Agra-Ost ASBL à St Vith ;
- ELIA-UCL à Louvain-la-Neuve;
- Le Centre de Michamps ASBL à Michamps ;
- Le CRA-W – Département agriculture et milieu naturel à Libramont ;
- Le CPL-VEGEMAR ASBL à Waremme.

Localisation des partenaires expérimentateurs de Fourrages Mieux



Rue du Carmel 1
BE – 6900 Marloie
Tél. : 061/210.833
www.fourragesmieux.be



Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en consultant notre site Internet :
<http://www.fourragesmieux.be/partenaires.html>

Certaines données, notamment pour les espèces « secondaires », proviennent également d'un partenariat avec l'Allemagne dans le cadre du Centre transfrontalier GLEA à Bitburg.

Avec le soutien :



**Tableau 1. Liste des variétés de ray-grass anglais (RGA) recommandées pour
2025 par groupe de précocité**

Les variétés sont présentées par ordre alphabétique dans chaque groupe. Les variétés précoces sont peu préconisées pour le pâturage et pour les zones froides (Ardenne, Haute Ardenne).

1. <u>Variétés précoces</u> - diploïdes (2n) - tétraploïdes (4n)	Rosetta* (Ba) Genesis (DLF) Algira* (DSV) Bartasja (Ba) Melromi (Wes)	Panino (DSV) Mirtello* ^D (DSV) Salmo ^D (Freu) Tharon* (Lid)
2. <u>Variétés intermédiaires</u> - diploïdes (2n) - tétraploïdes (4n)	Boyne ^D (DLF) Cangou (JPS) Lobrac* (Cer) Activa* ^D (JPS) Astonhockey* ^D (DSV) Barcampo ^D (Ba) Barfamos (Ba) Boccacio* ^D (JPS) Briant (Ba) Cantalou* ^D (JPS) Elgon* (NP) Elixir* (Cer) Explosion ^D (DSV) Garbor ^D (DLF)	Magnificat* (Cer) Melspring (Ba) Moira (Ba) Juras (Cer) Marnière (Eliard) Maurizio* (DSV) Matenga ^D (NPZ) Novello ^D (LG) Olive* (LG) Soraya* ^D (Freu) Sucral* (Cer) Weldone* (LG)
3. <u>Variétés tardives</u> - diploïdes (2n) - tétraploïdes (4n)	Barimero (Ba) Catanga (JPS) Dropper (Lid) Albion (Cer) Alcazar* (SF) Barganza (Ba) Barpasto* ^D (Ba) Dromara (Ba) Calao* (JPS) Fleuron* (Lid) Hopi* (LG) Gildas (Lid) Macarena (JPS) Melbolt (DLF) Melfrost ^D (Freu)	Gerfaut* (Lid) Rossimonte* (DSV) Melkana (Ba) Mellara* (DLF) Meltador ^D (Wes) Meltoro* (Arv) Meracoli (JPS) Sherlock (DSV) Torrus* (Lid) Vicaretto* (JPS) Valerio* ^D (DSV) Virtuose* (JPS) Xanthus (DSV)

() = mandataire: Arv= Arvesta, Ba = Barenbrug, Cer = Cerience, DLF = DLF-Seeds, DSV = Deutsche Saatveredelung, Freu= Freudenberger, ILVO = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, JPS = Jorion-Philip-seeds, Lid = LIDEA, LG = LG Seeds, NPZ, RAGT, SF = Semences de France, Wal = Walagri, Wes = Westyard.

* Les variétés marquées avec * sont recommandées pour les sursemis vu leur agressivité.

^D Les variétés marquées avec ^D sont également recommandées en Allemagne, par le groupe de travail « Coordination des essais et des recommandations pour prairies en région de moyenne montagne ».

Toutes les variétés sont aussi adaptées à l'agriculture biologique !

Tableau 2. Variétés recommandées appartenant à d'autres espèces (présentées par ordre alphabétique)

<u>Ray-grass italiens</u> - diploïdes (2n)	Aeros (Ba) Atoll (Cer) Cocar (JPS) Ensilor (Lid)	Inducer (LG) Itaka (DLF) Melprimo (Wal)
	- tétraploïdes (4n) Ancar (JPS) Barmultra II ^D (Ba) Itarzi (DLF) Melmia (Wes)	Melodia (Wal) Meltop (ILVO) Rulicar (JPS)
<u>Ray-grass hybrides</u> - tétraploïdes (4n)	Astoncrusader (DSV) Barvitra (Ba)	Cabestan (JPS) Melaunis (Lid)
<u>Festulolium</u> -Fet.Elevée x RGI	Mahulena ^D (DLF)	
<u>Fléoles</u>	Cantal (JPS) Cavalet (DLF) Comer ^D (ILVO) Dolina (DLF)	Lischka ^D (DSV) Radde (DSV) Summergraze ^D (DLF)
<u>Dactyles</u>	Archibaldi (Ba) Asopia (RAGT) Bently (RAGT) Caius (JPS) Captur (LG) Dactina (JPS) Destiny (Cer) Daly (Cer)	Galibier (Cer) Kobako (DLF) Lokis (Lid) Lucullus (Cer) RGT Beverly (RAGT) Tenderly (RAGT) Vostox (Freu)
<u>Fétuques des prés</u>	Baltas ^D (DSV) Barcrypto (Ba) Harlequin (DLF) Hyperbola (DLF) Modena (ILVO)	Pardus ^D (Freu) Prayola (Lid) Predor (DLF) Schwetra (DSV)

<u>Fétuques élevées</u>		
- Intermédiaire	Lydie (Lid)	Rosparon (DSV)
- Tardive	Agile (Cer) Alienor (Cer) Apalona (Ba) Bardoux (Ba) Bariane (Ba) Barolex (Ba)	Castagne (RAGT) Iliade (Cer) Paolo (Ba) Romie (Cer) Rotino (DSV) Roza (Lid)
<u>Trèfles blancs de fauche</u>		
	Melifer (Cer) Merlyn (Freu)	Milagro (LG) Violin (LG)
<u>Trèfles violets</u>		
- diploïdes (2n)	Callisto (DLF) Lemmon (Ba) Lestris (Cer) Merviot (ILVO)	Reichesberger (SF) Sangria (SF) Spurt (Ba)
- tétraploïdes (4n)	Atlantis (DSV) Magellan ^D (LG)	Maro (LG)
<u>Luzernes (type Nord)</u>		
	Andantino (DLF) Artemis (Ba) Barmelie (Ba) Barnard (Ba) Chapka (Lid) Cigale (DLF) Cybelle (RAGT) Dentelle (RAGT) Dulciane (DLF) Etincelle (RAGT)	Fleetwood ^D (DSV) Idylle (Lid) Linsey (Cer) Lopaly (Cer) Ludelis (DLF) Luxury (Cer) Milky Blue (Freu) Milky Max (Cer) Plato ^D (Freu) Salsa (DLF)

Tableau 3. Variétés appartenant à des espèces secondaires recommandées en Allemagne par le groupe de travail « Coordination des essais et des recommandations pour prairies en région de moyenne montagne ».

<u>Pâturins des prés</u>		
	Chester Lato	Liblue Likollo
<u>Fétuques rouges</u>		
	Gondolin Rafael	Reverent Roland 21